

CATÉTER

HERRAMIENTA



DESCRIPCIÓN Y USOS

Es un dispositivo con forma de tubo estrecho y alargado que puede ser introducido dentro de un tejido o vena. Los catéteres permiten la inyección de fármacos, el drenaje de líquidos o bien el acceso de otros instrumentos médicos. Existen 2 tipos de catéter.

Catéteres de corta duración

catéteres centrales • catéteres periféricos

Catéteres de larga duración

Hickman • Reservorio • Picc

Catéter de corta duración

El Catéter Venoso Periférico (CVP) o de vía periférica y el Catéter Venoso Central (CVC). Ambos tienen en común el material con el que están fabricados (polímeros) y los dos se usan para tratamientos cortos.

El CVP se utiliza para tratamientos cortos poco agresivos. Y el CVC para tratamientos agresivos de corta duración y puede tener dos o tres luces.

Catéter de larga duración

Como su nombre lo dice se utilizan para tratamientos agresivos con duración en el tiempo. Ejemplo: Hickman Reservorio Picc

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



GUANTES DE LATEX



BATA



GAFAS DE SEGURIDAD



GORRO



MASCARILLA

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA

- HERIDAS EN DEDOS Y MANOS
- LESIONES OCUALRES POR SALPICADURAS
- LACERACIONES EN DEDOS Y MANOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Recuerde llevar siempre el cabello recogido
- Antes de iniciar labores debe retirar joyas de manos y antebrazos.
- Antes de iniciar el procedimiento realice lavado de manos según protocolo y posterior a ello colóquese los siguientes elementos de protección individual: gafas, mascarilla, gorro, guantes de látex. Manténgalos puestos hasta finalizar el proceso
- Si durante el procedimiento se rompe un guante, este debe retirarse inmediatamente, lavarse las manos y colocarse un nuevo par.
- Sostenga de manera firme el dispositivo; después de realizar la punción con el dispositivo deséchelo de manera inmediata en el guardián.
- Antes de la manipulación debe cubrirse las lesiones cutáneas, los cortes y las heridas.
- Debe ponerle el esquema de vacunación completo de acuerdo al área de trabajo.

- Si observa al paciente estupefacto o irritado solicite la colaboración de los compañeros para la realización del procedimiento.
- Deseche inmediatamente en el guardián el dispositivo.
- Explíquelo al paciente el procedimiento que va a realizar de una manera sencilla para obtener la mayor colaboración de este.
- Realice orden y aseo en el área de trabajo al finalizar la labor.

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.

Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Vida Suramericana S.A © Propiedad Intelectual de ARL SURA, 2021.

Línea de atención 01 8000 511 414

arlsura.com